


18-10-2018/BDAKM

MAXFORCE WHITE IC

<p>Tuhoeläinten torjunta-aine</p> <p>Käyttötarkoitus: Torakoiden torjuntaan sisätiloissa. Valmiste on tarkoitettu vain ammattimaiseen käyttöön.</p> <p>Noudata käyttöohjeita ihmiselle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.</p>	<p>Insektimedel</p> <p>Användningsändamål: För bekämpning av kackerlackor inomhus. Preparatet är endast avsett för yrkesmässigt bruk.</p> <p>Följ bruksanvisningen för att undvika faror för människor och miljön.</p>
<p>Tehoaineet: imidaklopridi 21,5 g/kg Valmistetyyppi: GS</p>	<p>Aktiva substans: Imidakloprid 21,5 g / kg Produkttyp: GS</p>
<p>Uusi lupanumero: TUKES-2015-BTA-003</p>	
<p>Luvan haltija/Tillståndets innehavare: Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 13 2300 S. København (Danmark/Tanska) Puh/Tel: +358 20 785 21</p>	
	
<p>Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seosta sekä 1,2-bentsisotiatsoli-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.</p>	<p>Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one (3:1) samt 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Kan orsaka en allergisk reaktion. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet skall behandlas som farligt avfall och tomma behållaren som blandavfall.</p>
<p>Ympäristöhaittojen ehkäisy: Ylijäänyt, käyttökelvoton torjunta-aine viedään ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjä myyntipakkaukset yleiselle kaatopaikalle.</p>	<p>Förhindrande av skador på miljön: Överblivet, oanvändbart bekämpningsmedel förs till en insamlingspunkt för problemavfall och tomma förpackningar förs till en allmän avstjälpningsplats.</p>
<p>Suojainohjeet: Valmistetta käsiteltäessä suositellaan käytettäväksi</p>	<p>Skyddsutrustning: Vid hantering av preparatet rekommenderas</p>

kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili).	användning av kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril).
<p>Käyttöohje: Maxforce White IC on käyttövalmis syötti, joka maistuu erittäin hyvin torakoille. Valmisteen käyttöä helpottaa erillinen annostelupistooli (myydään erikseen), jolla valmisteen sopivan määrän annostelu käy kätevästi. Valmisteen käyttöä suositellaan erityisesti tiloissa, joissa ruiskutteiden käyttö on hankalaa. Torjunnan onnistumiseksi on tärkeää, että alueella noudatetaan hyvää hygieniää. Ruoantähteen yms. jätteet on siivottava mahdollisimman hyvin pois. Maxforce White IC:n käyttöä ei suositella pinnoilla, joita on käsitelty muilla hyönteisten torjuntaaineilla. Geeliä ei myöskään pidä käsitellä jälkeensä millään kemikaalilla, joka voi pilata sen houkuttelevuutta. Geeli kiinnittyy useimmille pinnoille. Sitä annostellaan hyönteisten piilopaikkoihin, kuten reunojen ja listojen alle, halkeamiin, putkistoihin yms. paikkoihin. Syötin sijoittelua avoimiin ja kulutukselle alttiisiin paikkoihin on vältettävä, samoin kuin paikkoja joita pestään usein. Torjunta on suunniteltava niin, etteivät ihmiset, eläimet, kasvit tai elintarvikkeet tule kosketuksiin aineen kanssa. Syöttiä ja sen kulutusta on seurattava säännöllisesti. Tarvittaessa käsitteily uusitaan. Torakat kuolevat muutaman tunnin kuluttua syönnin jälkeen. Valmistella on kerrannaisvaikutus, eli torakka kuolee myös syötyään valmisteseeseen menehtyneen tai menehtymässä olevan torakan. Torjunnan päätyttyä jäljelle jäänyt geeli pestään pois. esim. 5 %:lla natriumkloridiliuoksella.</p>	<p>Instruktioner för användning: Maxforce White IC är ett bruksklart bete, som är särskilt smakligt för kackerlackorna. Användningen av preparatet underlättas avsevärt av en appliceringspistol (säljs separat), med vilken doseringen av en lagom mängd går behändigt. Preparatet rekommenderas särskilt för användning där sprutmedel inte kan användas. För att säkra ett gott bekämpningsresultat är det viktigt, att god hygien tillämpas på området. Matrester o.dyl. avfall bör städas bort möjligast noggrant. Användning av Maxforce White IC rekommenderas inte på ytor där andra insektbekämpningsmedel har använts. Gelen skall inte heller efteråt behandlas med andra kemikalier, som kan förstöra den lockande effekten. Gelen fäster på de flesta ytor. Det doseras på insekternas gömställen, såsom under kanter och lister, i sprickor, rör etc. Applicering av preparatet på öppna ytor som utsätts för slitage bör undvikas, liksom på ytor som tvättas ofta. Bekämpningen bör planeras så, att inte människor, djur, växter eller livsmedel kommer i kontakt med ämnet. Betet, och åtgången av det, bör följas med regelbundet. Vid behov upprepas behandlingen. Kackerlackorna dör inom några timmar efter att de förtärt ämnet. Preparatet har dominoeffekt, dvs. en kackerlacka dör av att äta en kackerlacka som redan dött av ämnet. Efter avslutad behandling tvättas den resterande gelen bort, t.ex. med en 5 %-ig natriumkloridlösning.</p>
<p>Annostelu: Maxforce White IC annostellaan tippoittain. Tipan halkaisijan koko voi olla jopa 5 mm, mikä vastaa n. 0,1 grammaa syöttiä. Annosteltava määrä riippuu eläinmäärästä ja torakkalajista. Suositeltava käyttömäärä on 1-3 tippaa/m² tai juoksumetriä kohti (0,1 – 0,3 g/m² tai jm). Suuret torakkalajit, kuten <i>Periplaneta americana</i>, <i>P. orientalis</i> ja <i>P. australasiae</i> (amerikantorakka, ruotsintorakka,</p>	<p>Dosering: Maxforce White IC appliceras droppvis. Diametern på en droppe kan vara t.o.m. 5 mm, vilket motsvarar ca 0,1 g bete. Mängden som doseras beror på djurmängden och art. Den rekommenderade bruksmängden är 1-3 droppar/m² eller löpmeter (0,1 – 0,3 g/m² eller lm). Stora kackerlocksarter, såsom <i>Periplaneta americana</i>, <i>P. orientalis</i> och <i>P. australasiae</i></p>

<p>australiantorakka) vaativat suurempia käyttömääriä, kuten myös pienempien lajien (<i>Blattella germanica</i> (russakka) ja <i>Supella longipalpa</i> (ranskantorakka) runsaat esiintymät.</p> <p>Tuubi riittää noin 100 – 300 m²:n käsittelyyn.</p>	<p>(amerikansk, orientalisk respektive australiske kackerlacka) kräver större bruksmängder, liksom även rikliga förekomster av små arter (<i>Blattella germanica</i> (tysk kackerlacka) och <i>Supella longipalpa</i> (brunbandad kackerlacka, tv-kackerlacka)).</p> <p>En tub räcker till behandling av 100-300 m².</p>
---	---